

OBEČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ



č.: 11 | Týden: 30 | Období: 25. 7. 2016 - 31. 7. 2016

PADLÍ RÉVOVÉ

Na lokalitách, kde již dosáhly bobule velikosti hrachu, končí vysoká citlivost hroznů vůči napadení padlím (bobule jsou větší a odolnější). Existují však lokality, kde jsou vinice padlím napadeny silně. Zde je již důležité intenzivně kombinovat systémové přípravky s kontaktními (Kumulus, Sulfomax). V případě extrémního napadení doporučujeme aplikaci přípravku Karathane New a především zasáhnout oblast zóny hroznů. Tlak padlí révového je nyní obecně na střední úrovni.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Podmínky pro rozvoj peronospory jsou stále velmi příznivé. Dochází k pravidelným srážkám, delšímu ovlhčení listové plochy, vyšší relativní vlhkosti, což jsou ideální podmínky pro rozvoj plísně révové. Na více lokalitách se také projevy této choroby ukazují v různých intenzitách a lze pozorovat i významné napadení bobulí. Obecně se potýkáme s vysokým nebo středním infekčním tlakem plísně révové. Stále je důležité nepodceňovat situaci a aplikovat jedny z posledních systemických postřiků na plíseň.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

V současné době je velmi důležitá aktivní ochrana proti šedé hnilobě a to zejména u odrůd s hustým hroznem. Ve fázi zapojování či uzavírání hroznů je důležité nepodcenit situaci a aplikovat preventivní postřik (Teldor, Switch). Významná jsou další opatření, která omezí či zabrání poškození hroznů, především účinná ochrana proti 2. generaci obalečů (Integro, Lepinox Plus).

VÝŽIVA

V současné době je stále optimální doba na aplikaci mimokořenové výživy, především doporučujeme soustředit se na vápník, který zpevňuje bobule a slouží tak jako nepřímá ochrana vůči šedé hnilobě (WUXAL Kalcium, Lamag Ca či Campofort Ca).




DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky		
	padlí révové	plíseň révová	padlí révové	plíseň révová	plíseň šedá
Březí			Luna Experience	Ridomil Gold Combi Pepite	
Bzenec			Zato	Mildicut	Teldor
Čejč			Sulfomax	Flowbrix	
Čejkovice					
Lednice					
Lužice					
Němčičky					
Nosislav					
Novosedly					
Pavlov					
Popice					
Přítluky					
Ratíškovice					
Strážnice					
Těšany					
Tvrdonice					
Velké Bílovice					
Velké Pavlovice					
Znojmo					
Modra (SK)					
Mužla (SK)					
Šenkvice (SK)					
Tajná (SK)					
Legenda	silný	střední	slabý		



Výhled počasí



Další důležité informace

V době nejvyšší infekce (viditelné silné příznaky) by měly být aplikovány systémové fungicidy v kombinaci s kontaktními (plíseň révová: měď, folpet, mankozeb; padlí révové: síra).

Pro zajištění vyšší účinnosti aplikovaných fungicidů a také s ohledem na častý výskyt srážek, je vhodné do tankmixu přidávat smáčedlo. Dojde tak k vyšší účinnosti postřiku (pokrytí větší části listové plochy, rychlejší vstup účinných látek do rostlin).

Na všech etiketách jsou vždy uvedeny ochranné lhůty, na které je třeba dbát, a to zejména u raných odrůd.

Vzhledem k opakovaným deficitům vápníku v keřích révy pro vás na další sezónu připravujeme unikátní kurativní přípravek!