

OBECNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 12 | Týden: 31 | Období: 1. 8. 2016 - 7. 8. 2016



PADLÍ RÉVOVÉ

Bobule zejména raných odrůd jsou nyní odolnější vůči napadení padlím révovým. Na některých lokalitách však lze pozorovat výraznější napadení padlím (především na hroznech). Infekce může při intenzivním slunečném počasí pokračovat. V případě extrémního napadení (viditelný šedý povlak na hroznech) doporučujeme aplikaci přípravku Karathane New a postřík soustředit především do oblasti zóny hroznů. Tlak padlí révového je nyní obecně na vysoké úrovni.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Infekční tlak peronospory stále trvá a je velmi intenzivní. Vydatné srážky vytváří vhodné podmínky pro další šíření, některé vinice jsou poškozeny silně. Výrazné napadení lze pozorovat na bobulích i záliscích, které jsou přitom velmi důležité pro optimální vyzrálост hroznů. Obecně se potýkáme se středním až vysokým infekčním tlakem plísně révové.

PLÍSEŇ ŠEDÁ










Vzhledem k vydatným dešťovým srážkám v posledních dnech je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost ošetření proti botrytidě. Nastává období zvýšené vnímavosti hroznů k infekci. Ve fázi zapojování a uzavírání hroznů doporučujeme aplikaci kombinovaného prostředku proti plísni šedé (Teldor, Switch). Vhodné jsou také přípravky proti peronospoře vykazující významnou vedlejší účinnost proti botrytidě (Folpan, Pegaso F, Vincare). Tlak plísně šedé je na střední úrovni.

VÝŽIVA


V současné době je optimální doba na dodání listové výživy, především vápníku a draslíku. Vhodnými přípravky jsou WUXAL Kombi a WUXAL Kalcium. Díky přísunu draslíku lze do jisté míry pozitivně ovlivnit cukernatost hroznů a také podpořit vyzrávání jednoletého dřeva.



DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky		
	padlí révové	plíseň révová	padlí révové	plíseň révová	plíseň šedá
Březí			Falcon 460 EC	Cassiopee 79 WG	Switch
Bzenec			Talent	Mildicut	Teldor
Čejč			Sulfomax	Cuproxtat	Mythos
Čejkovice					
Lednice					
Lužice					
Němčičky					
Nosislav					
Novosedly					
Pavlov					
Popice					
Přítluky					
Ratíškovice					
Strážnice					
Těšany					
Tvrdonice					
Velké Bílovice					
Velké Pavlovice					
Znojmo					
Modra (SK)					
Mužla (SK)					
Šenkvice (SK)					
Tajná (SK)					
Legenda	silný	střední	slabý		

Výhled počasí



Další důležité informace

Vzhledem k deštivému počasí doporučujeme nepodceňovat zejména fungicidní ochranu proti plísní révové a plísní šedé. Zejména u ranějších odrůd, které začnou být v příštích dnech ve fázi počátku zrání, je riziko napadení těmito chorobami velmi vysoké.

Kromě klasické fungicidní ochrany doporučujeme v této době používat i přípravky s obsahem rostlinných hormonů, které dokáží indukovat obranné reakce révy vinné a tlumí růst houbových patogenů.

Pro zajištění vyšší účinnosti aplikovaných fungicidů a také s ohledem na častý výskyt srážek, je vhodné do tankmixu přidávat smáčedlo. Dojde tak k vyšší účinnosti postřiku (pokrytí větší části listové plochy, rychlejší vstup účinných látek do rostlin).

Přípravek Karathane New mimo funkce „zhášeče“ padlí omezuje také výskyt svilušek.