

OBECNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 14

Týden: 33

Období: 16. 8. 2016 - 22. 8. 2016



PADLÍ RÉVOVÉ

Bobule raných odrůd jsou vůči napadení padlím odolné. Infekční tlak postupně stagnuje. V případě extrémního napadení doporučujeme aplikaci přípravku Karathane New (lze použít 4 x), mělo by dojít k zastavení infekce. Tlak padlí révového je nyní obecně na střední úrovni.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Na více lokalitách došlo k silnějším projevům infekčního tlaku plísně révové. Ohroženy jsou také révové školky a mladé výsadby. U pozdních odrůd, které jsou plísní napadeny, lze stále použít kombinovaný fungicid, který bude chránit případné nové přírůstky. Obecně se potýkáme s vysokým infekčním tlakem peronospory.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

Některé „burčákové“ odrůdy již zrají. Tyto odrůdy jsou nyní nejcitlivější k rozvoji plísně šedé. V případě dlouhodobých a vydatných srážek doporučujeme zejména u pozdních odrůd provedení preventivní ochrany, nejlépe s kombinovaným kontaktním i systémovým účinkem proti hnilobě SWITCH (0,96 kg/ha). Relativně krátké ochranné lhůty (14 dní) mají přípravky Teldor a Rovral Aquaflo. Jejich aplikaci je nyní možné provést i u odrůd, které budou sbírány již začátkem září.

VÝŽIVA


Stále lze u středně pozdních a pozdních odrůd podpořit tvorbu cukrů pomocí výživy. Doporučujeme hnojivo s vyšším obsahem draslíku, například WUXAL Kombi. Draslík mimo jiné podporuje vyhrávání dřeva. Ke zvýšení obranyschopnosti keřů přispívají také přípravky na bázi mořských řas, například SOFTGUARD či ROOTMOST.

DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky		
	padlí réвовé	plíseň réвовá	padlí réвовé	plíseň réвовá	plíseň šedá
Březí	Yellow	Red	Karathane New	Ridomil Gold MZ Pepite	Teldor
Bzenec	Red	Red	Discus	Folpan	Rovral Aquaflo
Čejč	Red	Yellow	Kumulus	Antre 70 WG	Thiram Granuflo
Čejkovice	Yellow	Yellow			
Lednice	Red	Yellow			
Lužice	Red	Red			
Němčičky	Yellow	Green			
Nosislav	Red	Red			
Novosedly	Yellow	Yellow			
Pavlov	Red	Red			
Popice	Red	Yellow			
Přítluky	Red	Yellow			
Ratíškovice	Yellow	Red			
Strážnice	Red	Red			
Těšany	Yellow	Green			
Tvrdonice	Yellow	Red			
Velké Bílovice	Red	Yellow			
Velké Pavlovice	Red	Yellow			
Znojmo	Yellow	Red			
Modra (SK)	Red	Red			
Mužla (SK)	Red	Red			
Šenkvice (SK)	Red	Red			
Tajná (SK)	Yellow	Red			
Legenda	silný	střední	slabý		



Výhled počasí



Další důležité informace



Při použití měďnatých fungicidů je třeba dodržet stanovenou ochrannou lhůtu (většinou 35 dní). Výhodou přípravků Airone SC, Defender a Flowbrix je kratší OL (21 dní) a lze je tedy použít zejména u raných odrůd. Stejně tak je nutné přihlížet k ochranným lhůtám i u ostatních přípravků.



Na území ČR byl v roce 2016 na okrese Břeclav zaznamenán první výskyt **kříška révového** (*Scaphoideus titanus*). Jedná se o přenašeče významné choroby révy vinné – fytoplazmy zlatého žloutnutí révy (*Grapevine flavescence dorée fytoplasma*). Mezi nejcitlivější kultivary patří Chardonnay a Zweigeltrebe. Mezi citlivé odrůdy jsou dále řazeny Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Cabernet Sauvignon, Frankovka a Rulandské modré.

