

OBECNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 15

Týden: 34

Období: 23. 8. 2016 - 29. 8. 2016



PADLÍ RÉVOVÉ

Infekční tlak postupně stagnuje a období vnímavosti k infekci končí. V případě velmi silných projevů padlí u některých pozdních odrůd lze v případě potřeby použít přípravky s 14ti denní ochrannou lhůtou (Impulse Super, Falcon, Luna Experience) či některé z pomocných přípravků na ochranu rostlin. Tlak padlí révového je nyní obecně na střední úrovni, citlivé k napadení mohou být zejména mladé zálisky, které jsou důležité pro tvorbu cukrů v hroznech.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Plísní révou byly výrazně napadeny především révové školky a mladé výsadby. Nyní dochází k částečné regeneraci keřů a utváří se nová listová plocha, která je důležitá ke tvorbě dostatečného množství zásobních látek a vyzrávání dřeva. Zejména v mladých výsadbách je příhodná doba pro aplikaci přípravků s růstovými stimulanty. Tlak plísně révové postupně klesá.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

U všech odrůd nastoupila a probíhá fáze zaměkání a zrání. Preventivní ochranu u pozdních odrůd lze stále provádět, nejlépe s kombinovaným kontaktním i systémovým účinkem proti hnilobě SWITCH (0,96 kg/ha). Relativně krátké ochranné lhůty (14 dní) mají přípravky Teldor a Rovral Aquaflo, které jsou vhodné k ošetření ranějších odrůd. K minimalizaci rozvoje plísně šedé pomáhá také odlistění zóny hroznů, zejména u velmi zahuštěných odrůd. Vhodným přípravkem proti botrytidě může být Vitisan, který mimo fungicidního efektu poskytuje keřům révy draslík, který je důležitý pro kvalitní vyzrávání dřeva.




DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky		
	padlí réвовé	plíseň réвовá	padlí réвовé	plíseň réвовá	plíseň šedá
Březí	silný	střední	Karathane New	Ridomil Gold MZ Pepite	Teldor
Bzenec	silný	střední	Aqua Vitrin K	Cuproxat	Vitisan
Čejč	slabý	střední	Sulfomax	Antre 70 WG	Aqua Vitrin K
Čejkovice	slabý	střední			
Lednice	silný	střední			
Lužice	silný	střední			
Němčičky	slabý	střední			
Nosislav	silný	střední			
Novosedly	slabý	střední			
Pavlov	silný	střední			
Popice	slabý	střední			
Přítluky	silný	střední			
Ratíškovice	slabý	střední			
Strážnice	silný	střední			
Těšany	silný	střední			
Tvrdonice	slabý	střední			
Velké Bílovice	slabý	střední			
Velké Pavlovice	silný	střední			
Znojmo	slabý	střední			
Modra (SK)	silný	střední			
Mužla (SK)	slabý	střední			
Šenkvice (SK)	silný	střední			
Tajná (SK)	slabý	střední			
Legenda	silný	střední	slabý		



Výhled počasí



Další důležité informace

Při použití jakýchkoli přípravků k ochraně révy vinné je třeba dodržovat stanovenou ochrannou lhůtu. Vybírejte je s ohledem k ranosti dané odrůdy.

V letošním roce lze prakticky na každé vinici vidět příznaky choroby ESCA. U modrých odrůd, například u RM (obr.), lze pozorovat postupné červené zabarvování v okolí žilnatin, která plynule přechází v nekrotizaci. Jednoleté letorosty velmi špatně nebo vůbec nedozrávají. Keře doporučujeme označit a v období zimního řezu kmínek postupně seřezávat na „zdravé“ dřevo.

