

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 3 Týden: 22 Období: 30. 5. 2016 - 5. 6. 2016

PADLÍ RÉVOVÉ ●

Nyní nastaly a i v průběhu období se očekávají příznivé podmínky pro šíření padlí, **je třeba urychleně zahájit ošetření rizikových porostů**. V období před kvetením révy vždy nastává zvýšená citlivost k napadení. Doporučujeme použití systémových fungicidů, které chrání i nové přírůstky. Vydatné dešťové srážky mohou sekundární šíření omezit.

Přípravky: IQ-Crystal, Prosper



PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Není nutné ošetřovat proti plísni révové, pokud nebyl na stanovišti zjištěn první výskyt choroby. Při teplotě 18 °C trvající déle než 6 dnů, zahajte sledování příznaků choroby. Předpokládají se podmínky vhodné pro klíčení oospor a infekci. Primární příznaky (olejové skvrny) se většinou objevují nejdříve na mladých listech.

Přípravky: ANTRE 70 WG, MILDICUT



OBALČ MRAMOROVANÝ A OBALČ JEDNOPÁSÝ ●

Postupně končí let motýlů první generace. Ohrožené porosty měly být v minulém období dle signalizace ošetřeny. Samičky obalčů nyní mohou začít klást vajíčka na květenství révy.

Přípravky: SPINTOR (eko)



SVILUŠKY ●


Na různých lokalitách bylo v minulosti zjištěno silnější napadení porostů, doporučujeme ošetření keřů. Od 4. roku stáří vinice lze v IP použít proti fytozugním roztočům pouze dravého roztoče *T. pyri*.

Přípravky: MASAI



Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné

Výhled počasí



V případě použití „dalších prostředků“ podle zákona o rostlinolékařské péči (adjuvant, bioagens, látka podporující zdravotní stav rostlin...) a nejedná se o přípravek na ochranu rostlin podle tohoto zákona, pak se aplikace takovéto látky do počtu aplikací v podopatření IP **NEZAPOČÍTÁVÁ**. Tzn.: do počtu aplikací se započítá pouze produkt, který je zaregistrován jako „klasický“ přípravek na ochranu rostlin. (zdroj: MZE)

Další důležité informace:

Vzhledem k vydatným dešťovým srážkám a vhodným teplotním podmínkám, doporučujeme aplikaci **preventivních postřiků proti padlí i plísní révové**, optimálně se systémovým či kombinovaným účinkem. Na lokalitách a u vybraných odrůd, kde se fáze révy velmi blíží kvetení, lze v závěru období použít i některé přípravky z řad vyspělejších fungicidů.

Veškeré fungicidní přípravky doporučujeme vzhledem ke vzniku možné rezistence vzájemně obměňovat.

Nastává velmi vhodná doba pro aplikaci **živin** potřebných **pro správný a zdravý odkvět révy** vinné (B, Mo, Zn) ve formě mimokořenové výživy.

Přípravky: MIKRORICH, PREV-B2.