

OBEČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 5

Týden: 24

Období: 14. 6. 2016 - 20. 6. 2016



PADLÍ RÉVOVÉ

Na některých lokalitách či u náchylných odrůd byly zjištěny první příznaky choroby a ve druhé polovině období může docházet k dalšímu šíření. Vzhledem k charakteru počasí však neočekáváme masivní infekční tlak.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Existují vhodné teplotní i srážkové podmínky pro rozvoj infekce, na některých lokalitách již byly zaznamenány primární příznaky. V průběhu dalšího týdne jsou očekávány přeháňky a bouřky, které mohou rozvoj choroby podpořit. Nejpozději před květem mělo být provedeno minimálně první systémové ošetření porostů, které má ochránit vysoce citlivá květenství před napadením. Doporučujeme kontrolu porostů přímo na vinici a na základě signalizace použít vhodný fungicid.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

V případě deštivého a chladnějšího počasí v době dokvétání révy (80 % odkvetlých květů) je třeba provést ošetření proti botrytiové hnilobě květenství. Květenství jsou na infekční tlak velmi citlivá.

VÝŽIVA

U odrůd, které stále nekvety, je vhodná aplikace živin bóru či molybdenu, které zabrání tzv. sprchávání. U odrůd již odkvetlých doporučujeme aplikaci přípravků s obsahem zinku, který působí pozitivně na prorůstání pylové láčky po opylení a tedy podporuje nasazování bobulí. Vhodnými přípravky před květem jsou PREV-B2, LAMAG Mo, po odkvětu lze použít HYCOL K+ víno s vyšším podílem zinku.

DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Březí		
Bzenec		
Čejč		
Čejkovice		
Lednice		
Lužice		
Němčičky		
Nosislav		
Novosedly		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Ratíškovice		
Strážnice		
Tvrdonice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Mužla (SK)		
Šenkvice (SK)		
Tajná (SK)		

Doporučené přípravky	
padlí révové	plíseň révová
Prosper + Kumulus	Profiler
Topas	Antre 70 WG
Sulfomax	Folpan



Přípravky nepoužívejte ve fázi kvetení révy (BBCH 61-65).

Legenda


silný

střední

slabý

nehodnoceno

Výhled počasí



Další důležité informace:

Nedoporučujeme fungicidy aplikovat přímo ve fázi kvetení révy (BBCH 61-65), použijte je před či po odkvětu (riziko poškození květenství). Pouze přípravek PROFILER lze aplikovat i v době kvetení.

Vzhledem k charakteru počasí v těchto dnech, lze na některých lokalitách očekávat zvýšení infekčního tlaku plísně révové. Proto na místech, kde je réva před květem doporučujeme ochranu s kombinovaným účinkem proti botrytiové hnilobě.

Veškeré fungicidní přípravky doporučujeme vzhledem ke vzniku možné rezistence vzájemně obměňovat. Rádi Vám poradíme.