

OBEČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 6

Týden: 25

Období: 21. 6. 2016 - 27. 6. 2016



PADLÍ RÉVOVÉ

Velmi příznivé podmínky pro šíření padlí by měly nastat v průběhu tohoto týdne (minimálně 3 dny za sebou teplota 21–30 °C), ve druhé polovině lze očekávat méně příznivé podmínky (teploty nad 33 °C). Ihned po fázi kvetení by mělo být provedeno další ošetření po odkvětu, nejlépe fungicidem se systemickým účinkem. V případě velmi silného tlaku doporučujeme kombinovanou fungicidní ochranu (systém, kontakt).

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

V případě vydatných srážek (přeháňky, bouřky) může docházet k dalšímu šíření choroby. Nadále je třeba sledovat primární výskyty a šíření na vinici. Po odkvětu je na rizikových lokalitách nutné provést druhé obligátní ošetření všech porostů, které má chránit při změně počasí vysoce citlivé mladé hrozny před napadením. Na lokalitách, kde se křivka týdenních úhrnů srážek dostala do oblasti kalamitního výskytu, nebo byl zjištěn výskyt choroby, je třeba k ošetření použít kombinovaný fungicid.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

Při deštivém počasí v průběhu kvetení může docházet k rozvoji šedé hniloby květenství. Na květenství může docházet k nedokonalému opadu květních čepiček, na nichž se *Botrytis cinerea* rozvíjí a ta pak mohou hnědnout a usychat. V pozdějších fázích může docházet až k nežádoucímu uvadání trápiny. Náchylné jsou zejména odrůdy s hustým hroznem. K rozvoji patogenu může docházet postupně i při nižších teplotách.


VÝŽIVA

V průběhu kvetení nedoporučujeme aplikaci jakékoli výživy na list. Mohlo by dojít k poškození květenství až ke sprchávání. Květenství jsou v tomto období vysoce citlivá na vnější vlivy. U již odkvetlých odrůd doporučujeme aplikaci přípravků s obsahem zinku, který působí pozitivně na prorůstání pylové láčky po opylení a tedy příznivě působí na nasazování a udržení bobulí. Vhodným přípravkem po květu je HYCOL K+ víno, který obsahuje vyšší podíl zinku.

DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ


obec	Infekční tlak			
	padlí révové	plíseň révová		
Březí	slabý	nehodnoceno		
Bzenec	slabý	nehodnoceno		
Čejč	slabý	nehodnoceno		
Čejkovice	nehodnoceno	nehodnoceno		
Lednice	nehodnoceno	nehodnoceno		
Lužice	slabý	nehodnoceno		
Němčičky	nehodnoceno	nehodnoceno		
Nosislav	slabý	nehodnoceno		
Novosedly	slabý	nehodnoceno		
Pavlov	slabý	nehodnoceno		
Popice	nehodnoceno	nehodnoceno		
Přítluky	slabý	nehodnoceno		
Ratíškovice	nehodnoceno	nehodnoceno		
Strážnice	silný	nehodnoceno		
Tvrdonice	nehodnoceno	nehodnoceno		
Velké Bílovice	slabý	nehodnoceno		
Velké Pavlovice	slabý	nehodnoceno		
Znojmo	slabý	nehodnoceno		
Modra (SK)	nehodnoceno	nehodnoceno		
Mužla (SK)	nehodnoceno	nehodnoceno		
Šenkvice (SK)	slabý	nehodnoceno		
Tajná (SK)	nehodnoceno	nehodnoceno		
Legenda	silný	střední	slabý	nehodnoceno

Doporučené přípravky	
padlí révové	plíseň révová
Vivando	Melody Combi
Dynali	Pegaso F
Kumulus	Champion



Přípravky nepoužívejte ve fázi kvetení révy (BBCH 61-65).

Výhled počasí



Další důležité informace:

Nedoporučujeme jakékoli fungicidy aplikovat přímo ve fázi kvetení révy (BBCH 61-65), hrozí tak riziko sprchávání. V období po odkvětu by již měla být použita plná dávka přípravků.

Aktuální průběh počasí se může na květenství negativně odrazit a na některých lokalitách může dojít k rozvoji šedé hniloby květenství. Z tohoto důvodu je velmi důležité nepamírat na preventivní postřiky již v období před kvetením a zejména odrůdy náchylné na sprchávání navíc před květem podpořit mimokořenovou výživou (bór, molybden).