

# OBEČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 7

Týden: 26

Období: 28. 6. 2016 - 4. 7. 2016



## PADLÍ RÉVOVÉ

Při teplotách nad 21 °C po dobu delší než tři dny lze předpokládat vhodné podmínky pro šíření padlí a to zejména na teplejších lokalitách. Nyní, po kvetení, doporučujeme provedení dalšího ošetření proti padlí révovému, nejlépe systémovým fungicidem, který chrání i nové přírůstky. V případě velmi silného tlaku doporučujeme kombinovat s přípravkem Karathane New. Velkou pozornost je třeba věnovat odrudám náchylným na padlí (MP, VZ).

## PLÍSEŇ RÉVOVÁ

V minulém období byly na vybraných lokalitách zjištěny primární výskyty plísně révové a nadále existují příznivé podmínky pro další rozvoj infekce. Po odkvětu doporučujeme provedení druhého ošetření vhodným fungicidem dle míry infekčního tlaku a náchylnosti odrud. Nejvíce vhodná je kombinace systemické a kontaktní účinné látky.

## PLÍSEŇ ŠEDÁ

Díky deštivému počasí a dlouhodobému ovlhčení listové plochy a květenství může na některých lokalitách docházet k rozvoji botrytiové hniloby květenství. Je třeba věnovat pozornost přímé a nepřímé ochraně a to zejména u odrud s kompaktním hroznem. V případě silnějšího výskytu napadení hnilobou doporučujeme použití přípravku Thiram Granuflo.

## VÝŽIVA

Po odkvětu révy začíná stoupat intenzita příjmu všech živin, které jsou potřebné pro růst bobulí a tvorbu listové plochy. Vhodným přípravkem v období nasazování bobulí je WUXAL Kalcium, který obsahuje dusík, hořčík, vyšší podíl vápníku a mikroživiny v chelátové formě (snadno přijatelné rostlinou). Vyšší obsah vápníku podporuje pevnost bobulí a částečně se tak snižuje riziko napadení plísňovými chorobami.

# DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Březí	slabý	střední
Bzenec	slabý	střední
Čejč	slabý	střední
Čejkovice	slabý	střední
Lednice	střední	silný
Lužice	slabý	střední
Němčičky	slabý	střední
Nosislav	slabý	střední
Novosedly	slabý	střední
Pavlov	slabý	střední
Popice	slabý	střední
Přítluky	slabý	střední
Ratíškovice	střední	slabý
Strážnice	silný	silný
Tvrdonice	slabý	střední
Velké Bílovice	slabý	střední
Velké Pavlovice	slabý	střední
Znojmo	slabý	střední
Modra (SK)	střední	silný
Mužla (SK)	střední	silný
Šenkvice (SK)	slabý	silný
Tajná (SK)	slabý	silný


Legenda

	silný		střední		slabý		nehodnoceno
--	-------	--	---------	--	-------	--	-------------

Doporučené přípravky		
padlí révové	plíseň révová	plíseň šedá
Luna Experience	Acrobat MZ WG	
Luna Experience	Pegaso F	Thiram Granuflo
Kumulus	Folpan	



## Výhled počasí



## Další důležité informace:

V období po odkvětu již aplikujte plné dávky přípravků na ochranu rostlin i kapalných hnojiv, které jsou v etiketách doporučovány. Doporučujeme dodržovat antirezistentní strategii a přípravky po sobě jdoucí dle odlišných účinných látek kombinovat (návod k náhledu na prodejně).

Infekční tlak plísní lze podstatně snížit prováděním tzv. zelených prací (vylamování zálistků, odstraňování listů) a to zejména u náchylných odrůd (hustý hrozen, bujný růst).



Na vinicích se před kvetením často vyskytují chlorózy (hl. 'Pálava', 'Hibernal'), kterých příčinou je velmi častý nedostatek železa ale také vápníku v listech. Je třeba věnovat pozornost aplikaci uvedených prvků na list (Wuxal Kalcium, Brexil Fe). Po odkvětu by mělo zpravidla docházet ke zlepšení stavu.