

OBEČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 8

Týden: 27

Období: 4. 7. 2016 - 11. 7. 2016



PADLÍ RÉVOVÉ

Začátek července je již tradičně obdobím vysokého tlaku padlí révy. I nadále je proto třeba věnovat ochraně velkou pozornost, protože stále přetrvávají velmi příznivé podmínky. Ve vinicích se zejména na citlivých odrůdách, jako jsou Frankovka., Neuburské nebo Chardonnay objevují příznaky. Při výběru přípravků je třeba zohlednit antirezistentní strategii. Pokud nedojde k prudké změně počasí, tak lze předpokládat, že tlak padlí přetrvá celý týden.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

U vinohradníků, kteří dobře zasáhli proti primární infekci plísní révy a neumožnili rozvoj choroby, by v následujícím období nemělo hrozit vážnější nebezpečí. Směrem k zaměknání bobulí se také bude postupně zvyšovat přirozená odolnost starších listů. Rizikové může být pouze napadení zálistků, které začnou intenzivněji růst po osečkování, které ve vinicích právě probíhá. Je proto vhodné, v případě příznivých klimatických podmínek, sledovat případné příznaky na zálistcích.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

Již v předminulém týdnu bylo možné najít příznaky napadení šedou hnilobou (*Botrytis cinerea*) na listech a květenstvích. Botrytiová hniloba květenství révy se objevovala na květenstvích před kvetením, během kvetení a těsně po odkvětu. V případě silnějšího výskytu napadení hnilobou doporučujeme použití přípravku Thiram Granuflo či Switch.

VÝŽIVA

Po odkvětu révy stále stoupá intenzita příjmu všech živin, které jsou potřebné pro růst bobulí a tvorbu listové plochy. Vhodným přípravkem v období nasazování bobulí je WUXAL Kalcium (obsahuje dusík, hořčík, vyšší podíl vápníku, mikroživiny). Vyšší obsah vápníku (15%) podporuje pevnost bobulí a částečně se tak snižuje riziko napadení plísňovými chorobami.


DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak			
	padlí révové	plíseň révová		
Březí				
Bzenec				
Čejč				
Čejkovice				
Lednice				
Lužice				
Němčičky				
Nosislav				
Novosedly				
Pavlov				
Popice				
Přítluky				
Ratíškovice				
Strážnice				
Tvrdonice				
Velké Bílovice				
Velké Pavlovice				
Znojmo				
Modra (SK)				
Mužla (SK)				
Šenkvice (SK)				
Tajná (SK)				
Legenda	silný	střední	slabý	nehodnoceno

Doporučené přípravky		
padlí révové	plíseň révová	plíseň šedá
Vivando	Valis M	
Prosper	Acrobat MZ WG	Thiram Granuflo
Sulfomax	Folpan	



Výhled počasí



Další důležité informace:

V období po odkvětu již aplikujte plné dávky přípravků na ochranu rostlin i kapalných hnojiv, které jsou v etiketách doporučovány. Doporučujeme míchat pokud možno maximálně 3 různé koncentráty dohromady.

Dostáváme se do období výskytu silného tlaku zejména padlí. Doporučujeme provedení důkladného odstranění zálistků, případně listů v okolí zóny hroznů. Zelenými pracemi se významně snižuje riziko napadení plísněmi.

30. 6. došlo na některých lokalitách ke krupobití, které doprovázely vydatné dešťové srážky. Doporučujeme do postřiků zahrnout také preventivní fungicidy s účinkem proti plísní šedé + listovou výživu s obsahem vápníku k rychlejší regeneraci porostů.