

[Aktuální situace](#)


[Doporučení](#)

[Přípravky](#)

[Další důležité informace](#)

1. Aktuální situace

1.1. Meteorologie



www.meteoblue.cz

3-denní předpověď			
	ST	ČT	PÁ
Břeclav	20 °C	22 °C	23 °C
Brno	19 °C	20 °C	24 °C
Hodonín	20 °C	21 °C	22 °C
Uherské Hradiště	19 °C	21 °C	22 °C
Znojmo	19 °C	20 °C	23 °C

<http://www.yr.no>

1.2. Fenofáze révy

	
81	počátek zrání (zaměkání)
85	zrání (zaměkání) bobulí

V tomto období, podle lokalit a odrůd, probíhá nebo nastane fáze 81-85 BBCH.

1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu

	Patogen	Předpokládaná vhodnost podmínek	
CHOROBY	Plíseň révy	střední	
	Padlí révy	slabá / střední	
	Šedá hniloba hroznů révy	střední	
	Škůdce	Předpokládané riziko výskytu	
ŠKŮDCI	Hálčivec révový	slabé / střední	
	Vlnovník révový	slabé	
	Obaleči	slabé	
	Ostatní		

1.4. Aktuální výskyt sledovaných škodlivých organismů

- a) **Plíseň révy** – popis patogenu viz <http://www.ekovin.cz/choroby-a-skudci/plisen-revova>



Minulé období: V minulém období byly převážně méně příznivé podmínky pro šíření choroby. K dalšímu šíření choroby především na vrcholcích letorostů a na zálistcích mohlo dojít jen na lokalitách, kde byly vydatnější nebo opakované srážky. Napadené vrcholky letorostů a zálistků byly převážně odstraněny při osekávání. K napadení starších listů dolo jen ojediněle na lokalitách, kde byly vydatnější deště nebo nebyla zajištěna dostatečně intenzivní ochrana.

Aktuální vývoj:

K dalšímu šíření choroby může dojít v průběhu druhé poloviny a především závěru období.

Předpoklad dalšího šíření: Podle předpovědi budou dešťové srážky ve druhé polovině tohoto období. Tam, kde budou vydatnější a především opakované deště, může dojít k dalšímu šíření choroby. Nadále zůstávají významně ohroženy především révové školky a mladé výsadby.

- b) **Padlí révy** - popis patogenu viz - <http://www.ekovin.cz/choroby-a-skudci/padli-revove>



Minulé období: Na počátku minulého období byly příznivé podmínky pro patogen. Ve druhé polovině došlo k ochlazení a byly vydatnější dešťové srážky.

Aktuální vývoj choroby: Skončilo nebo postupně končí období vnímavosti hroznů k infekci.

Předpoklad dalšího šíření: K dalšímu šíření choroby na hroznech s výjimkou vývojově opožděných hroznů a bobulí pozdních náchylných odrůd již nedojde. Nadále může docházet k šíření choroby na listech a zálistcích.

- c) **Šedá hniloba hroznů** – popis patogenu viz- <http://www.ekovin.cz/choroby-a-skudci/plisen-seda>



Minulé období: V minulém období byly na počátku méně příznivé, ve druhé polovině relativně příznivé podmínky pro patogen (teploty nad 15 °C a dešťové srážky). Lokálně byly zjištěny, především u náchylných odrůd další, doposud ojedinělé výskyty choroby.

Aktuální vývoj:

V první polovině období budou nepříznivé, ve druhé polovině relativně příznivé podmínky pro patogen (dešťové srážky, vhodné teploty pro sporulaci a infekci). Tam, kde budou v průběhu druhé poloviny období vydatnější dešťové srážky, budou předpoklady pro další šíření choroby.

Ve fázi počátku zrání nastupuje období zvýšené vnímavosti hroznů k infekci. Vysoká vnímavost je dána morfologickými a fyziologickými změnami bobulí a hroznů. Významné jsou především narušená vosková vrstva na povrchu bobulí (možnost děletrvajících ovlhčení), změny ve složení bobulí a snížená produkce přirozených obranných látek (fytoalexinů), u révy především stilbenů (trans-resveratrol aj.).

Předpoklad dalšího šíření: U velmi raných a raných odrůd nastoupila a u ostatních odrůd podle lokalit a odrůd nastupuje fáze počátku zrání, kdy začíná období zvýšené vnímavosti hroznů k infekci. Tam, kde budou v průběhu druhé poloviny tohoto období dešťové srážky, mohou být splněny předpoklady infekcí a následně výskytu choroby.

d) Chřadnutí a odumírání révy (ESCA)

Aktuální vývoj:

Na mnoha lokalitách byly zjištěny velmi časně a silné výskyty chřadnutí a odumírání révy (ESCA). Mimořádné výskyty souvisejí s průběhem počasí (teplé periody a současný dostatek vláhy) v průběhu minulých období, které vytvořilo předpoklady pro rozvoj patogenu v pletivech hostitele. Nejpočetnější výskyty byly zjištěny u odrůdy 'Sauvignon'.

Předpoklad dalšího šíření:

Postupně lze předpokládat další nárůst výskytů choroby.

Příznaky choroby:

Na listech mezi hlavními žilkami vznikají nejdříve žlutozelené (bílé odrůdy) nebo červenofialové (modré odrůdy), různě veliké, často nepravidelné skvrny. Skvrny se zvětšují a splývají. Pletiva mezi nervy a okraje listů postupně nekrotizují („tygrovitost“). Nekrotické plochy zůstávají olemovány světle žlutým (bílé odrůdy) nebo červenofialovým (modré odrůdy) okrajem. Hrozny jsou menší a na bobulích se často vyskytují černofialové skvrny. Silněji postižené keře náhle odumírají. V letošním roce je zvýšený výskyt akutního projevu onemocnění, u něž se neprojeví výše popsané typické příznaky na listech (zpočátku skvrnitost, později „tygrovitost“) a keř náhle apoplekticky hyne. Na řezu hlavou nebo kmínkem poškozených keřů lze pozorovat hnědou nekrózu a později bílý rozklad dřeva.

Původci choroby jsou v našich podmínkách nejčastěji stopkovýtrusé houby rodů *Fomitiporia* a *Stereum* a věckovýtrusé houby rodu *Botryosphaeria*. Vyskytují se však i další patogeny, především *Phaeomoniella chlamydospora*.

Původci přetrvávají v napadených rostlinných částech, někteří i v půdě. K infekcím dochází přes poranění, především při časném zimním řezu (deštivé a teplé periody v zimním období). Choroba se může šířit také množitelským a výsadbovým materiálem a infekcí z půdy.

Ochranná opatření:

Ochrana spočívá v prevenci, především je třeba zajistit plnou vitalitu keřů, řez provádět co nejpozději v předjaří, omezit velká poranění, řezné rány na starším dřevě ošetřit přípravky k ošetření ran. Odstraňovat a likvidovat zdroje infekce ve vinici a v okolí vinice. Drtit jen révu a dvouleté dřevo.

2. Živočišní škůdci

3.1 Obaleč mramorovaný a obalečik jednopásný



Popis škůdce - <http://www.ekovin.cz/choroby-a-skudci/obalec-mramorovany-obalec-jednopasy>

Předpoklad dalšího šíření:

Skončil let motýlů 2. generace obalečů.

3.2 Hálčivec révový



Aktuální výskyt:

Lokálně byly zjištěny i silnější letní výskyty škůdce.

Předpoklad dalšího šíření:

V současné době probíhá období přechodu přezimujících samic (deutogyne) do zimních úkrytů.

3. Doporučení

3.1. Plíseň révy (vyhodnocení situace z jednotlivých meteorologických stanic naleznete [zde](#))

Stanovení potřeby ošetřování: V současné době se křivka sumy týdenních úhrnů srážek pohybuje na většině sledovaných lokalit v oblasti sporadicko-kalamitního a na některých lokalitách i v oblasti kalamitního výskytu.

- **Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek (od 1. 5.) ke dni 20.8. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 216 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 293 mm.**
- **V současné době se podle této metody ošetřuje, pouze pokud se křivka kumulativních úhrnů srážek pohybuje v oblasti kalamitního výskytu.**
- **Ošetřeny by měly být především porosty na lokalitách s aktuálně vydatnějšími dešťovými srážkami a porosty, kde dochází k dalšímu šíření choroby.**
- Pro pozdní ošetření jsou nejvhodnější měďnaté fungicidy (nejlépe zajistí ochranu starých listů, zlepšují vyzrávání révy a rezidua mědi příznivě ovlivňují zdravotní stav moštů a u modrých odrůd i vybarvení vína) a současně naplňují podmínku náhrady fungicidu dle NV 75/2015 Sb.
- Měďnaté fungicidy působí pouze preventivně, je třeba je použít před dešťovými srážkami, které splní podmínky infekce nebo infekční periody.
- **Upozorňujeme na to, že u měďnatých fungicidů je třeba dodržet stanovenou ochrannou lhůtu** (většinou OL 35 dní, mimo přípravků Airone SC, Cuprozin Progress, Defender a Flowbrix (OL 21 dní)).
- Pokud byl již vyčerpán limit mědi (3 kg/ha/rok) a nebyly dosud provedeny 4 ošetření organickými fungicidy, je třeba použít organický fungicid.
- Přípravky s kratší ochrannou lhůtou (pod 30 dnů): [Forum Star](#) (28), [Melody Combi](#) 65,3 (28), [Mildicut](#) (21), [Moximate 725 WG](#) (28), [Pergado F](#) (28), [Pegaso F](#) (28), [Profler](#) (21), [Ridomil Combi MZ Pepite](#) (15), [Ridomil Gold Combi Pepite](#) (28), [Tanos 50 WG](#) (28), [Alginure](#) (AT)
- Zvýšenou pozornost je třeba věnovat révovým školkám a mladým výsadbám.

3.2. Padlí révy (vyhodnocení situace z jednotlivých meteorologických stanic naleznete [zde](#))

Stanovení potřeby ošetřování: **Skončilo, nebo v průběhu tohoto období skončí vnímavost hroznů k infekci. Proti padlí není třeba již ošetřovat.**

3.3. Šedá hniloba hroznů révy

Stanovení potřeby ošetření: U velmi raných a raných odrůd nastoupila a u ostatních odrůd postupně nastupuje fáze počátku zrání.

- Ve fázi počátku zrání se zpravidla provádí základní ošetření proti šedé hnilobě hroznů révy.
- V minulém období byl vhodný termín pro dokončení ošetření velmi raných a raných odrůd.
- **Ostatní, především náchylné odrůdy, je třeba ošetřit ve fázi počátku zrání.**
- **U velmi raných náchylných odrůd, především tam kde byly zjištěny výskyty, je třeba zvážit potřebu opakování ošetření v tomto období (interval 10-14 dnů).**
- **Upozorňujeme, že v nadstavbové IP musí být použity proti šedé hnilobě hroznů dvě ošetření pomocnými prostředky, povolenými podle zákona o EZ ([VitiSan](#), [NatriSan](#), [AquaVitrin K](#)).**
- Vzhledem k předpověděnému průběhu počasí je možno i v průběhu tohoto období (před dešťovými srážkami ve druhé polovině) použít proti šedé hnilobě hroznů révy pomocný prostředek [VitiSan](#). Vhodné je použít se smáčedlem (především [Wetcit](#)). Ošetření současně zajistí i ochranu vývojově opožděných hroznů a bobulí proti padlí révy.
- Pomocné prostředky [VitiSan](#) a [NatriSan](#) lze kombinovat s měďnatými fungicidy.
- Případná kombinace hydrogenuhličitanu s ostatními fungicidními účinnými látkami používanými proti plísni révy a padlí révy je možná. Většina účinných látek je dostatečně stabilní i v alkalickém

prostředí (k hydrolýze dochází až při pH okolo 9,0). pH 2% hydrogenuhličitanu draselného při 26 °C je 8,34.

- Přestože většina fungicidních látek je stabilní i při vysokém pH, doporučujeme provést před použitím test kompatibility. Vzhledem k tomu, že se při vysokém pH zhoršuje stabilita aplikační kapaliny (kratší DT₅₀), je nutno aplikační kapalinu co nejdříve spotřebovat.
- Tam, kde budou v průběhu tohoto období vydatnější deště, je vhodné použít k ošetření pozdnějších, zejména náchylných odrůd, specifický botryticid a pro další ošetření přípravek povolený pro EZ (naplnění požadavku náhrady fungicidu dle NV 75/2015 Sb.).
- Pokud budou použity specifické botryticidy, jsou pro období počátku zrání vhodné především přípravky **Cantus** (OL 28 dnů), **Switch** (35) a **Thiram Granuflo** (35), případně přípravky na bázi pyrimethanilu (**Minos**, **Mythos 30 SC**, **Pyrus 400 SC** (OL 21) a **Scala** (28)) a pro případné opakované ošetření přípravky **Prolectus**, **Rovral Aquaflo** nebo **Teldor 500 SC** (OL 14).
- **Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě hroznů je úplné provedení zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů. Přednostně je třeba dokončit odlistění velmi náchylných a náchylných odrůd.**

3.4 Obaleč mramorovaný a obalečik jednopásný

Stanovení potřeby ochrany: **V současné době již není vhodný termín pro ošetření porostů proti obalečům.** [Signalizace letu motýlů obalečů do feromonových lapáků – různé lokality](#)

3.4. Hálčivec révový

- Stanovení potřeby ochrany: V tomto období končí vhodný termín pro pozdně letní ošetření porostů.
 - **V současné době není registrován žádný akaricid k pozdně letnímu ošetření proti hálčivci révovému.**
 - Silněji napadeným porostům je třeba věnovat zvýšenou pozornost v jarním období.
- Upozorňujeme, že v IP lze proti hálčivci révovému provést ošetření elementární sírou jen do 3 let věku výsadby.**

3.5. Křísek révový

V minulém období byl pracovníky ÚKZÚZ poprvé zjištěn na území ČR výskyt kříska révového (*Scaphoideus titanus*), který může přenášet regulovanou (karanténní) chorobu fytoplazmové zlaté žloutnutí révy (Grapevine flavescence dorée phytoplasma).

agri.cz/public/web/ukzuz/portal/aktuality/krisek-revovy-prenasec-fytoplazmy.htm

Pracovníci ÚKZÚZ budou v nejbližší době provádět další, vymezovací průzkum.

4. Přípravky - Aktuální seznam povolených přípravků proti chorobám révy

skupina	Riziko rezistence	Choroba	použitelný pro		Dostupnost
		Plíseň révy	IP	EZ	
Amidy kyseliny karboxylové (CAAs)	nízké- střední	Acrobat MZ WG *	IP	-	
		Areva Combi *	IP		
		Cassiopee 79 WG *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Emendo M *	IP	-	
		Forum Gold *	IP	-	
		Forum Star *	IP	-	
		Melody Combi 65,3 WG *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Orvego (+ QoSI fungicidy)	IP	-	
		Pegaso F *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Pergado F *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Valis M *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Vincare *	IP	-	
Dithiokarbamáty	-	Antre 70 WG	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Dithane DG Neotec	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Dithane M 45	IP	-	
		Manfil 75 WG	IP	-	
		Manfil 80 WP	IP	-	
		Novozir MN 80 New	IP	-	
		Polyram WG	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Fenylamidy (PAs)	vysoké	Fantic F *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Ridomil Gold Combi Pepite *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Ridomil Gold MZ Pepite *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Fosfonáty	nízké	Alginure	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Momentum *	IP	-	
		Verita (+ QoI fungicidy)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Profiler (+ benzamidy)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Ftalimidy	-	Folpan 80 WG	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Kyanoacetamid oximy	nízké- střední	Curzate Gold *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Curzate M WG *	IP	-	
		Drago *			
		Moximate 725 WP *	IP	-	
		Zetanil WG *	IP	-	
		Cymbal	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Moximate 725 WG *	IP	-	
Quinon inside inhibitory (QIs)	střední - vysoké	Daimyo F *	IP	-	
		Mildicut	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Videryo F *	IP	-	
		Vincy F *	IP	-	
Quinon outside inhibitory (QoIs)	vysoké	Tanos 50 WG * (+ cymoxanil)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Cabrio Top *	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Quadris	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Verita (+ fosfonáty)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY

Účinná látka	Choroba	použitelné pro		Dostupnost
	Plíseň révy	IP	EZ	
hydroxid měďnatý + oxichlorid měďnatý	Airone SC	IP	EZ	
hydroxid měďnatý	Cuprozin Progress	IP	EZ	
	Defender	IP	EZ	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Funguran-OH 50 WP	IP	EZ	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Kocide 2000	IP	EZ	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Champion 50 WP	IP	EZ	
oxichlorid měďnatý	Bukanyr	IP	EZ	
	Cuprocaffaro Micro	IP	EZ	
	Flowbrix	IP	EZ	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Korzar	IP	EZ	
	Kuprikol 250 SC	IP	EZ	
	Kuprikol 50	IP	EZ	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
zásaditý síran měďnatý	Cuproxat SC	IP	EZ	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY

Přípravky na bázi mědi je možno použít v základní i nadstavbové IP neomezeně až do stanoveného limitu 3 kg/ha/rok. Použití mědi současně naplňuje podmínku povinného 1 ošetření (základní IP) nebo 2 ošetření (nadstavbová IP) přípravky povolenými podle zákona o ekologickém zemědělství.

Skupina	Riziko rezistence	Choroba	použitelný pro		Dostupnost
		Padlí révy	IP	EZ	
Arylphenylketony	střední	Vivando	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Aminy	nízké - střední	Prosper	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Azanaftaleny (AZNs)	střední	IQ-Crystal	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Talendo	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Talendo Extra (+ DMI fungicidy)	IP	-	
Inhibitory demetylace (DMI)	střední	Domark 10 EC	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Dynali (+ fenyl acetoamidy)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Falcon (+ aminy)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Impulse Super (+ aminy)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Misha 20 EW	IP	-	
		Rombus Trio (+ aminy)	IP	-	
		Talent	IP	-	
		Topas 100 EC	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Dinitrofenylkrotonáty	-	Karathane New	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Quinon outside inhibitory (QoIs)	vysoké	Cabrio Top	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Discus	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Quadris	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Zato 50 WG	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
Inhibitory sukcinát dehydrogenasy (SDHIs)	střední-vysoké	Collis (+ QoI fungicidy)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
		Luna Experience (+ DMI fungicidy)	IP	-	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY

Účinná látka	Choroba	použitelné pro		Dostupnost
	Padlí révy	IP	EZ	
elementární síra	Agrosales Síra 80	IP	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Kumulus WG	IP	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	LUK-sulphur WG	IP	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Nimbus WG	IP	EZ	
	POL Sulphur 80 WG	IP	Ez	
	POL Sulphur 80 WP	IP	EZ	
	Prokumulus WG	IP	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Síra BL	IP	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Síra 80 WG	IP	EZ	
	Siarkol 800 SC	IP	EZ	
	Stratus WG	IP	EZ	
	Sulfolac 80 WG	IP	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Sulfurus	IP	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Thiovit Jet	IP	EZ	
Přípravky je možno použít v základní i nadstavbové IP bez omezení (jsou povoleny podle zákona 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství). Použití elementární síry současně naplňuje podmínku povinného 1 ošetření (základní IP) nebo 2 ošetření (nadstavbová IP) přípravky povolenými podle zákona o ekologickém zemědělství.				

* Kombinace s další účinnou látkou s vícebodovým působením.

Použít je možno i ostatní přípravky povolené k souběžnému obchodu (souběžný dovoz pro obchodní použití)

Přípravky	škůdci	použitelné pro			Dostupnost
	Obaleči obaleč mramorovaný obalečích jednopásný	IP základní	IP nadstavba	EZ	
přípravky pro IP (nový závazek)	Integro	IP z	*	-	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	SpinTor	IP z	*	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Biobit XL	IP z	IP n	EZ	
	Lepinox Plus	IP z	IP n	EZ	 VINAŘSKÉ POTŘEBY
	Isonet L plus	IP z	IP n	EZ	
	Isonet LE	IP z	IP n	EZ	
	RAK 1+2 M	IP z	Ip n	EZ	
nelze použít v IP	Coragen 20 SC	-	-	-	
	Dimilin 48 SC	-	-	-	
	Steward	-	-	-	 VINAŘSKÉ POTŘEBY

*** Přípravky nelze použít v nadstavbové IP**

Měďnaté fungicidy
obsah mědi v přípravcích a přípustný počet ošetření v IP révy pro rok 2016
(při max. dávce 3 kg Cu/ha/rok)

Přípravek	Účinná látka	Obsah Cu	Dávka přípravku (kg/ha × l/ha)	Dávka Cu (g/ha) do/od 61 BBCH	Přípustný počet ošetření (plná dávka IP)	Používání povoleno do
Airone SC	hydroxid Cu + oxichlorid Cu	236,64 g/l 239,36 g/l	1,3 –2,6 l	618/ 1237,6	4–2	31.1.2019
Cuproxat SC	zásaditý síran Cu	190 g/l	2,5–5 l	475/ 950	3	31.5.2017
Champion 50 WP	hydroxid Cu	50% (500 g/kg)	2–4 kg	1000/ 2000	1	31.5.2019
Cuprocaffaro Micro	oxichlorid Cu	375 g/kg	1,75–3,50 kg	656,2/ 1312,5	2	31.5.2019
Cuprozin Progress	hydroxid Cu	250,0 g/l	0,8–1,6 l	200/ 400	7	18.12.2016
Defender	hydroxid Cu	250,0 g/l	0,8–1,6 l	200/ 400	7	18.12.2016
Flowbrix	oxichlorid Cu	380 g/l	1,25–1,5 2,5–3,0 l	475–670/ 950–1140	3–2 (3x do 2,7 l)	16.10.2017
Funguran-OH 50 WP	hydroxid Cu	50 %	2–4 kg	1000/ 2000	1	31.12.2016
Kocide 2000	hydroxid Cu	35 %	2,5–3,75 kg	875/ 1315	2	31.12.2016
Kuprikol 50	oxichlorid Cu	50 % (500 g/kg)	2–4 kg	1000/ 2000	1	31.5.2019
Kuprikol 250 SC	oxichlorid Cu	25 % (250 g/l)	3–4 6–8 l	750-1000/ 1500-2000	1	31.12.2018

Označené přípravky s končící registrací je nutné spotřebovat ještě v roce 2016

Charakteristika nově povolených přípravků na ochranu rostlin do révy

Plíseň révy (*Plasmopara viticola*)

Videryo F, Vincya F, Daimyo F (kyazofamid 40 g/l, folpet 400 g/l, formulace SC)

Kyazofamid je fungicidní účinná látka ze skupiny kyanoimidazolů. Působením náleží mezi QiI fungicidy (Quinone inside inhibitors). Je specificky účinná na oomycety. Působí preventivně a krátkodobě kurativně (do 24 hod). Účinkuje kontaktně a translaminárně. Působí v Qi místě cytochromálního komplexu bc₁, narušuje proces dýchání. Zabraňuje klíčení zoosporangii a zoospor, inhibuje pohyb zoospor a omezuje sporulaci. Je ohrožena rezistencí. Riziko vzniku rezistence je střední až vysoké (dle FRAC). Dodržovat obecná doporučení k oddálení vzniku rezistence.

Folpet patří do skupiny ftalimidů, působí kontaktně a účinkuje preventivně. Je účinný proti oomycetám (plíseň révy), původcům listových skvrnitostí (červená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hroznů révy). Zpevňuje pletiva a omezuje výskyt padlí. Neovlivňuje výskyt dravého roztoče *T.pyri* (populace Mikulov). Není ohrožen rezistencí (vícebodové působení).

Přípravky Videryo F, Vincya F, Daimyo F jsou určeny k ochraně révy proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používají v dávce 1,25 l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,25 %); a od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 2,5 l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,25 %).

Videryo F, Vincya F, Daimyo F jsou vhodné především k preventivnímu ošetření při silnějším ohrožení porostů.

Partneři

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava			
Zpráva č.: 14	Týden: 33	Období: 15.8.2016 – 21.8.2016	

Maximální počet ošetření 6x v průběhu vegetace. Povolený počet ošetření je nepřijatelný, neumožňuje naplnit zásady antirezistentní strategie. Vzhledem k míře rizika vzniku rezistence jsou přijatelná 2 – 3 ošetření v průběhu vegetace. Po 2 ošetřeních je třeba přerušit sled použitím fungicidu s odlišným působením. Přípravky jsou povoleny pouze pro ošetření moštových hroznů.

Ochranná lhůta (OL) 28 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci: ISK Biosciences Europe N. V. Brusel, Belgie

Orvego (ametoktradin 300 g/l, dimethomorf 250 g/kg, formulace SC)

Kombinovaný fungicidní přípravek. Ametoktradin je účinná látka ze skupiny triazolopyrimidylaminů (QoSI fungicidy). Účinkují specificky proti oomycetám. Působí kontaktně a především preventivně, účinná látka je zčásti vázána na voskovou vrstvu rostlinných částí, odkud je postupně redistribuována. Inhibuje diferenciaci zoospor v zoosporangiiích a klíčení zoospor. Působí v procesu mitochondriálního dýchání (komplex III dýchacího řetězce). Nebezpečí vzniku rezistence je střední až vysoké. Není cross – rezistence s QoI fungicidy. Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace.

Dimethomorf náleží do skupiny amidů kyseliny karboxylové (CAA fungicidy), je specificky účinný proti oomycetám. Působí kontaktně a systémově, účinkuje preventivně a krátkodobě kurativně, omezuje sporulaci. Působí specificky (jednobodově), inhibuje syntézu celulózy a její ukládání do buněčných stěn. Riziko vzniku rezistence je nízké až střední. Cross-rezistence v rámci CAA fungicidů - další přípravky na bázi dimethomorfu (Acrobat MZ WG, Areva Combi, Forum Gold, Forum Star), iprovalikarb (Cassiopee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG), benthiavalikarb (Vincare), mandipropamid (Pergado F), valifenalát (Emendo M, Valis M, Pegaso F).

Přípravky ze skupiny CAA fungicidů mohou být použity max. 4x nebo maximálně pro 50 % celkového počtu ošetření v průběhu vegetace (v IP max. 3x).

Přípravek Orvego je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 0,4 l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l/ha (min. koncentrace 0,08 %), a od fáze BBCH 61 v dávce 0,8 l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,08 %). Přípravek Orvego je doporučen především pro preventivní ošetření v období významného ohrožení porostů.

Maximální počet ošetření 3x během vegetace, po 2 ošetřeních přerušit sled použitím fungicidu s odlišným působením.

Ochranná lhůta (OL) 35 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci: BASF SE Ludwigshafen, Německo

Právní zástupce v ČR: BASF, spol. s r. o. Praha, ČR

Aktuální informace o povolených přípravcích jsou zveřejněny na Rostlinolékařském portálu

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior

5. Různé

- 1) **OPRAVA nepřesně uvedené informace o MLR pro fosfonáty** (fosetyl, kyselina fosforitá a její soli)
Podle platného nařízení Komise 2016/75 ze dne 21.1.2016, kterým se mění příloha Nařízení EP a Rady č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí (MLR) fosfonátů v některých produktech a na jejich povrchu, zůstává v platnosti u hroznů révy vinné (stolní i moštové) MLR pro fosfonáty 100 mg/kg. Konkrétní podmínky, které zajistí naplnění tohoto limitu u přípravku Alginure (počet aplikací, ochranná lhůta) budou stanoveny v průběhu registračního řízení.
- 2) Použití kombinací (TM) přípravků na ochranu rostlin, které nejsou povoleny pro použití v EZ, s přípravky nebo pomocnými prostředky podle zákona o EZ je možné (omezení nebezpečí vzniku rezistence, rozšíření účinnosti, posílení účinnosti), ale kombinace není náhradou za chemický fungicid ve smyslu požadavků NV 75/2015 Sb.
- 3) **Použití „dalších prostředků“ v rámci dotované IP** – v případě použití „dalších prostředků“ podle zákona o rostlinolékařské péči (adjuvant, bioagens, látka podporující zdravotní stav rostlin...) a nejedná se o přípravek na ochranu rostlin podle tohoto zákona, pak se aplikace takovéto látky do počtu aplikací v podopatření Integrovaná produkce **NEZAPOČÍTÁVÁ**. Tzn.: do počtu aplikací se započítá pouze produkt, který je zaregistrován jako „klasický“ přípravek na ochranu rostlin.
- 4) **UPOZORŇUJEME že povinnost aplikací proti Šedé hnilobě hroznů révy se vztahuje na všechny vinice, na které je čerpána dotace v rámci IP AEO 2014-2020 a to včetně mladých porostů.**

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.

EKOVIN
Tomanova 18, 61300 Brno
info@ekovin.cz, www.ekovin.cz